

UNIVERSITÉ PARIS XI

U.E.R. MATHÉMATIQUE

91405 ORSAY FRANCE

25724

n° 180

LE DOUBLE COMMUTATEUR

R. R. Coifman et Y. Meyer



Analyse Harmonique d'Orsay  
1976

25724

n° 180

LE DOUBLE COMMUTATEUR

R. R. Coifman et Y. Meyer



Analyse Harmonique d'Orsay  
1976

## LE DOUBLE COMMUTATEUR

par R. R. Coifman et Y. Meyer

Nous nous proposons de prouver les deux résultats suivants.

THEOREME 1. Soient a et b deux fonctions dans  $L^\infty(\mathbb{R})$ . Désignons par A une primitive de a et par B une primitive de b. Alors pour toute fonction  $f \in L^2(\mathbb{R})$

$$(1) \quad \lim_{\epsilon \downarrow 0} \int_{|y-x| \geq \epsilon} \frac{[A(x)-A(y)][B(x)-B(y)]}{(x-y)^3} f(y) dy$$

existe pour presque tout x. Si l'on appelle  $\mathcal{C}(a,b,f)(x)$  cette limite, on a

$$(2) \quad \|\mathcal{C}(a, b, f)\|_2 \leq C \|a\|_\infty \|b\|_\infty \|f\|_2.$$

THEOREME 2. Plus généralement, supposons que a et b soient deux fonctions à oscillations moyennes bornées ( $a \in \text{BMO}$ ,  $b \in \text{BMO}$ ). Alors pour toute fonction  $f \in L^2(\mathbb{R})$

$$(3) \quad \lim_{\epsilon \downarrow 0} \int_{|y-x| \geq \epsilon} \frac{[A(x)-A(y)-(x-y)a(y)][B(x)-B(y)-(x-y)b(y)]}{(x-y)^3} f(y) dy$$

existe presque partout et, en appelant  $T(a, b, f)(x)$  cette limite, on a

$$(4) \quad \|T(a,b,f)\|_2 \leq C \|a\|_{\text{BMO}} \|b\|_{\text{BMO}} \|f\|_2.$$



Remarquons que le théorème 1 est déjà démontré dans [7]. Nous en donnons une preuve différente et beaucoup plus simple. Le théorème 2 est nouveau.

Le paragraphe 1 est consacré à la preuve de l'inégalité (2) dans le cas particulier où a, b et f appartiennent à  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ ; alors l'existence de la limite (1) ne pose aucun problème. La preuve de (2) provient de la construction d'une famille analytique  $T_z$  d'opérateurs bornés de  $L^2(\mathbb{R})$  telle que

(a)  $\sup_{\text{Re } z \geq 0} \|T_z\| < +\infty$  (si a et b appartiennent à  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ )

(b) si  $z = 1$ ,  $T_z$  soit le double commutateur

(c) si  $z$  est imaginaire pur,  $T_z$  soit un opérateur "classique" tel que  $\|T_z\| \leq C \|a\|_\infty \|b\|_\infty$ .

Il ne reste plus alors qu'à appliquer à  $T_z$  le principe du maximum.

Au paragraphe 2 nous étudions le cas général  $a \in L^\infty(\mathbb{R})$ ,  $b \in L^\infty(\mathbb{R})$  et  $f \in L^2(\mathbb{R})$ . Nous énonçons, au paragraphe 3, quelques corollaires du théorème 1 nécessaires à la démonstration du théorème 2, donnée au paragraphe 4. Les méthodes

employées ci-dessous ou dans [7] ne permettent pas, semble-t-il, d'étudier les opérateurs plus généraux  $\int \frac{[A(x) - A(y)]^n}{(x-y)^{n+1}} f(y) dy$  où  $A' = a \in L^\infty(\mathbb{R})$  et  $n \geq 3$ .

1. Dans un premier temps, nous allons supposer que a, b et f appartiennent à l'espace  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  des fonctions indéfiniment dérivables à supports compacts et nous allons utiliser une modification plus maniable de l'opérateur  $\mathcal{C}(a, b, f)$  définie par

(5)  $\tilde{\mathcal{C}}(a, b, f)(x) = \frac{d}{dx} \left\{ \int \frac{[A(x)-A(y)] [B(x)-B(y)]}{x-y} f'(y) dy \right\}$ .

Désignons par H la transformée de Hilbert et par  $\mathcal{C}_1(a, f)$  le commutateur de



Calderón :

$$(6) \quad \mathcal{C}_1(a, f)(x) = \int \frac{A(x) - A(y)}{(x-y)^2} f(y) dy \quad \text{et} \quad H(f)(x) = \int \frac{f(y)}{x-y} dy .$$

Une simple intégration par parties donne

$$(7) \quad \begin{aligned} \tilde{\mathcal{C}}(a, b, f)(x) = & 2 \mathcal{C}(a, b, f)(x) + b(x) H(af)(x) + a(x) H(bf)(x) - a(x) \mathcal{C}_1(b, f)(x) \\ & - b(x) \mathcal{C}_1(a, f)(x) - \mathcal{C}_1(a, bf)(x) - \mathcal{C}_1(b, af)(x). \end{aligned}$$

Nous voulons montrer l'existence d'une constante  $C > 0$  telle que, pour toute fonction  $a \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , toute fonction  $b \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  et toute fonction  $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , on ait

$$(8) \quad \|\mathcal{C}(a, b, f)\|_2 \leq C \|a\|_\infty \|b\|_\infty \|f\|_2.$$

Le théorème de Calderón [3], ou bien une transcription de la preuve donnée ci-dessous, montrent que

$$(9) \quad \|\mathcal{C}_1(a, f)\|_2 \leq C \|a\|_\infty \|f\|_2.$$

Compte tenu de (7) et (9), pour prouver (8) il suffit de vérifier que

$$(10) \quad \|\tilde{\mathcal{C}}(a, b, f)\|_2 \leq C \|a\|_\infty \|b\|_\infty \|f\|_2.$$

Si  $f_1, f_2, f_3$  sont trois fonctions de  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  dont les transformées de Fourier appartiennent à  $L^1(\mathbb{R})$ , on a, de façon évidente,

$$(11) \quad f_1(x) f_2(x) f_3(x) = \iiint_{\mathbb{R}^3} e^{i(\alpha+\beta+\gamma)x} \hat{f}_1(\alpha) \hat{f}_2(\beta) \hat{f}_3(\gamma) d\alpha d\beta d\gamma$$

où la mesure de Haar  $d\alpha d\beta d\gamma$  sur  $\mathbb{R}^3$  a été correctement normalisée.

Appliquant cette remarque à chacun des quatre morceaux de

$$\int \frac{[A(x)-A(y)] [B(x)-B(y)]}{x-y} f'(y) dy = A(x)B(x) H(f')(x) - A(x) H(Bf')(x) - B(x) H(Af')(x) +$$

$H(AB f')(x)$ , il vient

$$(12) \quad \tilde{\mathcal{C}}(a, b, f)(x) = -i\pi \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\gamma(\alpha+\beta+\gamma)}{\alpha\beta} \chi(\alpha, \beta, \gamma) e^{ix(\alpha+\beta+\gamma)} \hat{a}(\alpha) \hat{b}(\beta) \hat{f}(\gamma) d\alpha d\beta d\gamma$$

où  $\chi(\alpha, \beta, \gamma) = \text{sign}(\alpha + \beta + \gamma) - \text{sign}(\alpha + \gamma) - \text{sign}(\beta + \gamma) + \text{sign } \gamma$ . Une simple observation géométrique montre que, presque partout sur  $\mathbb{R}^3$ ,

$$(13) \quad \chi \neq 0 \Rightarrow \frac{\gamma(\alpha + \beta + \gamma)}{\alpha\beta} \in [-1, 0].$$

Soit  $P$  le demi plan fermé  $\text{Re } z \geq 0$ . Posons  $z = \sigma + i\tau$ . Pour tout  $z \in P$ ,

soit  $F_z$  la fonction de  $L^2(\mathbb{R})$  définie par

$$F_z(x) = i\pi \iiint_{\mathbb{R}^3} \left| \frac{\gamma(\alpha + \beta + \gamma)}{\alpha\beta} \right|^z \chi(\alpha, \beta, \gamma) e^{ix(\alpha + \beta + \gamma)} \hat{a}(\alpha) \hat{b}(\beta) \hat{f}(\gamma) d\alpha d\beta d\gamma. \text{ Montrons}$$

que si  $a, b$  et  $f$  appartiennent à  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ ,  $F_z \in L^2(\mathbb{R})$  et que  $z \rightarrow F_z$  est une

application de  $P$  dans  $L^2(\mathbb{R})$  continue sur  $P$  et holomorphe à l'intérieur de  $P$ .

$$\text{On a en effet} \quad F_z(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixs} G_z(s) ds$$

où  $s$  désigne  $\alpha + \beta + \gamma$  et où, grâce à (13),

$$|G_z(s)| \leq 2\pi \iint |\hat{f}(s - \alpha - \beta) \hat{a}(\alpha) \hat{b}(\beta)| d\alpha d\beta \in L^2(ds).$$

Les deux autres propriétés de l'application  $z \rightarrow F_z$  sur  $P$  résultent de (13) et du théorème de convergence dominée de Lebesgue.

Remarquons que  $\sup_{z \in P} \|F_z\|_2 < +\infty$  et que

$$(14) \quad F_1(x) = \tilde{\mathcal{C}}(a, b, f)(x).$$

Soit  $m$  un entier positif. En appliquant à la fonction holomorphe vectorielle  $(1+z)^{-m} F_z$

le principe du maximum, nous pouvons majorer  $\|\tilde{\mathcal{C}}(a, b, f)\|_2$  par

$$2^m \sup (1 + \tau^2)^{-m/2} \|F_{i\tau}\|_2. \text{ Il reste à montrer l'existence d'une constante } C > 0$$

telle que, si  $m$  est assez grand, on ait, pour toute valeur du nombre réel  $\tau$ ,

$$(15) \quad \|F_{i\tau}\|_2 \leq C(1 + \tau^2)^{m/2} \|a\|_\infty \|b\|_\infty \|f\|_2.$$

Cette dernière inégalité résulte très simplement de la proposition suivante.

PROPOSITION 1. Soient  $u(x)$  et  $v(x)$  deux fonctions de  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  dont les transformées de Fourier appartiennent à  $L^1(\mathbb{R})$ . Si  $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , on pose

$$(16) \quad \Gamma(u, v, f)(x) = \int \frac{(u(x)-u(y))(v(x)-v(y))}{x-y} f(y) dy.$$

Alors il existe une constante  $C > 0$ , indépendante de  $u, v$  et  $f$  telle que

$$(17) \quad \|\Gamma(u, v, f)\|_2 \leq C \|u\|_{\text{BMO}} \|v\|_{\text{BMO}} \|f\|_2.$$

Admettons provisoirement ce résultat et démontrons (15).

$$\text{Si } z = i\tau, \quad \left| \frac{\gamma(\alpha+\beta+\gamma)}{\alpha\beta} \right|^{i\tau} = |\gamma|^{i\tau} |\alpha+\beta+\gamma|^{i\tau} |\alpha|^{-i\tau} |\beta|^{-i\tau}.$$

Appelons  $M_\tau$  l'opérateur de convolution associé au multiplicateur

$$|\alpha|^{i\tau} : M_\tau(f) = g \quad \text{si} \quad \hat{g}(\alpha) = |\alpha|^{i\tau} \hat{f}(\alpha), \quad \alpha \in \mathbb{R}. \quad \text{Posons } a_\tau = M_{-\tau} a, \quad b_\tau = M_{-\tau} b.$$

On a ([8])

$$(18) \quad \|a_\tau\|_{\text{BMO}} \leq C(1 + |\tau|) \|a\|_\infty$$

$$\text{et} \quad \|b_\tau\|_{\text{BMO}} \leq C(1 + |\tau|) \|b\|_\infty$$

(on peut améliorer les inégalités (18) mais dans notre cas  $1 + |\tau|$  est suffisant).

$$\text{Enfin } F_{i\tau} = -M_\tau \left\{ \int \frac{[a_\tau(x) - a_\tau(y)][b_\tau(x) - b_\tau(y)]}{x-y} f_{-\tau}(y) dy \right\}.$$

Les inégalités (17) et (18) entraînent (15) avec  $m = 2$ .

La démonstration suivante de la proposition 1 est due à R. Rochberg ([9]).

Nous allons, en fait, utiliser le lemme 1 ci-dessous pour prouver un résultat plus général (lemme 2).

LEMME 1. Il existe une constante  $\delta > 0$  telle que, pour toute fonction

$$u \in \text{BMO} \quad \text{telle que} \quad \|u\|_{\text{BMO}} \leq \delta, \quad \text{le noyau} \quad K(x, y) = \frac{e^{u(x)-u(y)}}{x-y} \quad \text{soit borné sur} \quad L^2.$$

Si  $u$  est à valeurs réelles, ce résultat est prouvé dans [6]: le poids  $e^{u(x)} = \omega(x)$  vérifie la condition  $A_2$  de Muckenhoupt. Si  $u = u_1 + iu_2$  où  $u_1$  et  $u_2$  sont réels, on a  $K(x, y) = e^{iu_2(x)} K_1(x, y) e^{-iu_2(y)}$ : le noyau  $K_1$  est borné sur  $L^2$  et est composé avec deux opérateurs unitaires sur  $L^2$ ;  $K$  est borné sur  $L^2$ .

LEMME 2. Pour toute fonction  $u \in \text{BMO}$  et tout entier  $k \geq 0$ , le noyau  $\frac{[u(x) - u(y)]^k}{x - y}$  est borné sur  $L^2$ .

On peut évidemment se restreindre au cas où  $\|u\|_{\text{BMO}} \leq \frac{\delta}{2}$ . On écrit alors

$$\frac{[u(x) - u(y)]^k}{x - y} = \frac{k!}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \frac{e^{\zeta [u(x) - u(y)]}}{x - y} \frac{d\zeta}{\zeta^{k+1}}$$

et l'on applique le lemme 1.

## 2. Preuve du théorème 1 dans le cas général.

Nous venons de terminer la démonstration de l'inégalité (8). Pour finir la preuve du théorème 1, nous allons introduire la notion de "noyau de Calderon-Zygmund" et rappeler une inégalité due à Cotlar ([10] p. 218).

Un noyau de Calderón-Zygmund est une fonction  $k(x, y)$ , à valeurs complexes, définie sur  $\mathbb{R}^2$  privé de la diagonale  $D$  et possédant les trois propriétés a), b) et c) suivantes.

(a)  $k(x, y) \in \Lambda_1(\mathbb{R}^2 \setminus D)$ ; plus précisément il existe une constante  $C > 0$  telle que, pour presque tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus D$ , on ait

$$\left| \frac{\partial k}{\partial x} \right| \leq C(y - x)^{-2}, \quad \left| \frac{\partial k}{\partial y} \right| \leq C(y - x)^{-2} \quad \text{et} \quad |k(x, y)| \leq C(y - x)^{-1}.$$



(b) pour toute fonction  $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ ,  $\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|y-x| \geq \varepsilon} k(x,y) f(y) dy$  existe pour presque tout  $x \in \mathbb{R}$ .

(c) il existe une constante  $C > 0$  telle que pour toute  $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  on ait  $\|T(f)\|_2 \leq C \|f\|_2$  ;  $T(f)(x)$  est la limite définie par b).

Soit  $f^*$  la fonction maximale de Hardy et Littlewood de  $f$  et désignons par  $T_* f$  l'opérateur maximal associé à  $T$  et défini par

$$T_* f(x) = \sup_{\varepsilon > 0} \left| \int_{|y-x| \geq \varepsilon} k(x,y) f(y) dy \right|.$$

Si  $k(x,y)$  est un noyau de Calderón-Zygmund, la norme de  $k$ , notée  $\|k\|$ , est, par définition, la borne inférieure des constantes  $C > 0$  pouvant figurer dans a) et c)

PROPOSITION 2 (Cotlar). Il existe une constante  $C_1 > 0$  telle que pour tout noyau  $k(x,y)$  de Calderón-Zygmund et pour toute fonction  $f \in L^2(\mathbb{R})$  on ait, pour presque tout  $x$  réel,

$$(T_* f)(x) \leq C_1 \|k\| f^*(x) + C_1 (Tf)^*(x).$$

COROLLAIRE 1. Sous les hypothèses de la proposition 2, il existe une constante  $C_2$  telle que  $\|T_* f\|_2 \leq C_2 \|k\| \|f\|_2$ .

COROLLAIRE 2. Si  $k(x,y)$  est un noyau de Calderón-Zygmund et si  $f \in L^2(\mathbb{R})$ ,  $\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|y-x| \geq \varepsilon} k(x,y) f(y) dy$  existe pour presque tout  $x$ .

COROLLAIRE 3. Soit  $k_j(x,y)$ ,  $j \geq 0$ , une suite de noyaux de Calderón-Zygmund telle que  $\sup_{j \geq 0} \|k_j\| < +\infty$ . Supposons qu'il existe une fonction  $k(x,y)$  définie sur  $\mathbb{R}^2 \setminus D$ , vérifiant (a) et (b) et telle que  $k_j(x,y) \rightarrow k(x,y)$  presque partout sur  $\mathbb{R}^2 \setminus D$ . Alors  $k(x,y)$  est un noyau de Calderón-Zygmund.

En effet, pour tout  $\varepsilon > 0$  et toute  $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  et pour presque tout  $x$ ,

$$\int_{|y-x| \geq \varepsilon} k_j(x, y) f(y) dy \rightarrow \int_{|y-x| \geq \varepsilon} k(x, y) f(y) dy \quad (\text{puisque } |k_j(x, y)| \leq C |y-x|^{-1},$$

on peut appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue). On a donc, en

appelant  $T^j$  l'opérateur associé à  $k_j$ ,  $T_* f(x) \leq \underline{\lim} T_*^j f(x)$  presque partout.

Le corollaire 1 et le lemme de Fatou entraînent alors  $\|T_* f\|_2 \leq C \|f\|_2$  ; a fortiori

$\|T f\|_2 \leq C \|f\|_2$  ce qu'il fallait démontrer.

La preuve du théorème 1 sera complète si nous démontrons le résultat suivant.

PROPOSITION 3. Soient a et b deux fonctions de  $L^\infty(\mathbb{R})$ , A une primitive de a et B une primitive de b. Alors le noyau

$$k(x, y) = \frac{[A(x) - A(y)][B(x) - B(y)]}{(x - y)^3} \quad \text{est un noyau de Calderón-Zygmund.}$$

Nous allons d'abord montrer que  $k(x, y)$  vérifie les propriétés a) et b) de la définition des noyaux de Calderón-Zygmund ; a) s'obtient sans peine. Si  $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , on a, en intégrant par parties,

$$\begin{aligned} \int_{|y-x| \geq \varepsilon} k(x, y) f(y) dy &= -\frac{1}{2} \left[ \frac{(A(x)-A(y))(B(x)-B(y))}{(x-y)^2} \right]_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \\ &- \frac{1}{2} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{[A(x)-A(y)][B(x)-B(y)]}{(x-y)^2} f'(y) dy \\ &+ \frac{1}{2} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{B(x)-B(y)}{(x-y)^2} a(y) f(y) dy + \frac{1}{2} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{A(x)-A(y)}{(x-y)^2} b(y) f(y) dy. \end{aligned}$$

Le premier terme du membre de droite tend vers 0 pour presque tout  $x$  ; le second n'est plus une intégrale singulière : le noyau est devenu borné. Enfin les deux derniers termes sont les commutateurs d'ordre 1 de Calderón et ont des limites presque partout grâce aux résultats de [1].

Pour montrer (c), on appelle  $a_j$  et  $b_j$  deux suites de fonctions de  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  telles que  $\|a_j\|_\infty \leq \|a\|_\infty$ ,  $\|b_j\|_\infty \leq \|b\|_\infty$ ,  $a_j(x) \rightarrow a(x)$  presque partout et  $b_j(x) \rightarrow b(x)$  presque partout ( $j \rightarrow +\infty$ ). Soit  $k_j(x,y)$  le noyau

$$\frac{[A_j(x) - A_j(y)][B_j(x) - B_j(y)]}{(x-y)^3}$$

construit à l'aide des primitives  $A_j$  et  $B_j$  de  $a_j$  et  $b_j$ . L'inégalité (8) montre que  $k_j$  est une suite uniformément bornée de noyaux de Calderón-Zygmund. De façon évidente  $k_j(x,y) \rightarrow k(x,y)$  pour tout  $x$  et tout  $y \neq x$  ( $j \rightarrow +\infty$ ). Donc  $k(x,y)$  est un noyau de Calderón-Zygmund.

### 3. Résultats complémentaires utilisés dans la preuve du théorème 2.

Supposons maintenant que  $a$ ,  $b$  et  $f$  soient trois fonctions localement intégrables. On désigne par  $A$  une primitive de  $a$  et par  $B$  une primitive de  $b$  et l'on pose

$$(19) \quad \mathcal{E}_*(a,b,f)(x) = \sup_{0 < \varepsilon < T} \left| \int_{\varepsilon \leq |y-x| \leq T} \frac{[A(x)-A(y)][B(x)-B(y)]}{(x-y)^3} f(y) dy \right|.$$

On a alors le résultat suivant.

LEMME 3. Soit  $p \in ]2, +\infty[$ ; définissons  $q \in ]1, +\infty[$  par  $\frac{2}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

Il existe une constante  $C_p$  telle que pour toute fonction  $a \in L^p$ , toute fonction  $b \in L^p$  et toute fonction  $f \in L^q$ , on ait l'inégalité de type faible

$$(20) \quad \left| \{x \in \mathbb{R}, \mathcal{E}_*(a,b,f)(x) > \lambda\} \right| \leq \frac{C_p}{\lambda} \|a\|_p \|b\|_p \|f\|_q.$$

En fait l'inégalité (20) découle d'un résultat plus précis : pour tout  $r > 0$ , on a

$$(21) \quad \|\mathcal{E}_*(a,b,f)\|_r \leq C_r \|a^* b^* f^*\|_r.$$

Ici, comme plus haut,  $a^*$  est la fonction maximale de Hardy et Littlewood de  $a$ , etc.

Nous allons rappeler brièvement la preuve de (21) donnée dans [7]. Tout d'abord on peut se restreindre dans (20) au cas où  $f$ ,  $a$  et  $b$  appartiennent à  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ . Le cas général en découle en remarquant que  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  est dense dans  $L^p(\mathbb{R})$  et  $L^q(\mathbb{R})$  et en appliquant le lemme de Fatou. La preuve du lemme (4.8), p. 330, fournit

$$(22) \quad \left| \left\{ x \in \mathbb{R}, |\mathcal{C}(a,b,f)| (x) > \lambda \right\} \right| \leq C \left( \frac{\|a\|_1 \|b\|_1 \|f\|_1}{\lambda} \right)^{1/3}.$$

L'inégalité (22) et le lemme (4.2) de la page 327 de [7] entraînent

$$(23) \quad \left| \left\{ x \in \mathbb{R}, \mathcal{C}_*(a,b,f)(x) > \lambda \right\} \right| \leq C' \left( \frac{\|a\|_1 \|b\|_1 \|f\|_1}{\lambda} \right)^{1/3}.$$

Dès lors le lemme (4.5), page 328, donne (21).

4. Preuve du théorème 2. Fixons  $q$  dans  $]1, 2[$  (par exemple  $q = 3/2$ )

et définissons  $p$  par  $\frac{2}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Si  $a \in \text{BM0}(\mathbb{R})$ , on a

$$(24) \quad \sup_I \left( |I|^{-1} \int_I |a(t) - m_I a|^p dt \right)^{1/p} < +\infty ;$$

la borne supérieure est prise sur tous les intervalles de longueur finie non nulle et

$m_I a$  désigne la moyenne de  $a$  sur  $I$  (en particulier  $m_{[x,y]} a$  désignera, ci-

dessous, la moyenne de  $a$  sur l'intervalle  $[x, y]$ ). Au lieu de considérer l'opéra-

teur "bilinéaire"  $T(a,b,f)$ , il suffit d'étudier l'opérateur "quadratique"  $T(a,a,f)$

que nous noterons, pour abrégé,  $T(a,f)$ . Enfin  $T_*(a,f)$  désigne l'opérateur maximal

associé. On a donc

$$(25) \quad T(a,f)(x) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|y-x| \geq \varepsilon} \frac{(a(y) - m_{[x,y]} a)^2}{x-y} f(y) dy$$

et

$$(26) \quad T_*(a, f)(x) = \sup_{\epsilon > 0} \left| \int_{|y-x| \geq \epsilon} \frac{(a(y) - m_{[x, y]} a)^2}{x - y} f(y) dy \right|.$$

Quitte à multiplier  $a \in \text{BMO}$  par une constante, on peut supposer que le premier membre de (24) est égal à 1.

Nous allons d'abord vérifier que

$$(27) \quad \|T_*(a, f)\|_2 \leq C \|f\|_2.$$

Nous prouverons ensuite l'existence, pour presque tout  $x$ , de la limite écrite au second membre de (25).

Pour montrer (27), il suffit évidemment de se restreindre à un sous-espace dense dans  $L^2(\mathbb{R})$ . On pourra, par exemple, supposer que  $f$  est bornée et à support compact. Alors  $T_*(a, f)(x) = O(x^{-1} \log^2 |x|)$ ,  $|x| \rightarrow +\infty$ . Définissons une variante de la fonction maximale de Hardy et Littlewood de  $f$  par

$$(28) \quad M_q f(x) = \sup_{x \in I} (|I|^{-1} \int_I |f|^q(t) dt)^{1/q}.$$

Puisque  $q < 2$ , on a

$$(29) \quad \|M_q f\|_2 \leq C \|f\|_2.$$

Ainsi (27) résulte d'une propriété plus générale : pour tout  $r > 0$ , il existe une constante  $C_r$  telle que

$$(30) \quad \|T_*(a, f)\|_r \leq C_r \|M_q f\|_r.$$

L'inégalité (30) découle elle-même, grâce à la méthode introduite par Burkholder et Gundy ([2]), de l'inégalité "aux bons  $\lambda$ " suivante.

PROPOSITION 4. Il existe un nombre réel  $\gamma_0 > 0$  et une constante  $C > 0$  tels que pour tout  $\lambda > 0$  et tout  $\gamma \in ]0, \gamma_0[$ , on ait

$$(31) \quad \left| \left\{ T_*(a, f)(x) > 2\lambda ; M_q f(x) \leq \gamma\lambda \right\} \right| \leq C\gamma \left| \left\{ T_*(a, f)(x) > \lambda \right\} \right|$$

Puisque  $f$  est bornée et a un support compact, l'ensemble  $\Omega$  des  $x$  tels que  $T_*(a, f)(x) > \lambda$  est un ouvert borné, réunion dénombrable d'intervalles ouverts disjoints  $I_k = ]\alpha_k, \alpha_k + \ell_k[$ ,  $k \geq 0$ . Nous appellerons  $J_k$  les intervalles  $] \alpha_k - 3\ell_k, \alpha_k + 3\ell_k [$  associés.

Soit  $E \subset \Omega$  l'ensemble des  $x$  tels que  $T_*(a, f)(x) > 2\lambda$  et  $M_q f(x) \leq \gamma\lambda$  ; posons  $E_k = E \cap I_k$ . Pour démontrer (31), il suffit de vérifier que, pour tout  $k \geq 0$ ,

$$(32) \quad |E_k| \leq C\gamma |I_k|.$$

Si  $E_k = \emptyset$ , (32) est évidente ; sinon il existe au moins un  $\xi$  dans  $I_k$  tel que  $(M_q f)(\xi) \leq \gamma\lambda$ .

Dans ce dernier cas, on écrit  $f = f_1 + f_2$  où  $f_1 = f$  sur  $J_k$  et  $f_1 = 0$  sur  $J_k^c$ .

Puisque le centre de  $J_k$  est  $\alpha_k$ , on a

$$(33) \quad T_*(a, f_2)(\alpha_k) \leq T_*(a, f)(\alpha_k) \leq \lambda.$$

L'inégalité (32) résultera alors des deux inégalités suivantes

$$(34) \quad |T_*(a, f_2)(x) - T_*(a, f_2)(\alpha_k)| \leq C_1 (M_q f)(\xi) \leq C_1 \gamma\lambda$$

et

$$(35) \quad \left| \left\{ x \in I_k ; T_*(a, f_1)(x) > \lambda(1 - C_1\gamma) \right\} \right| \leq C_2 \gamma (1 - C_1\gamma)^{-1} |I_k|.$$

Pour être plus explicite, on a  $T_*(a, f) \leq T_*(a, f_1) + T_*(a, f_2)$ . Or, pour tout  $x \in I_k$ , il vient grâce à (33) et (34),  $T_*(a, f_2)(x) \leq \lambda + C_1\gamma\lambda$ . Si donc  $T_*(a, f)(x) > 2\lambda$ , il est nécessaire que  $T_*(a, f_1)(x) > \lambda - C_1\gamma\lambda$  ; grâce à (35),

$$|E_k| \leq C_2 \gamma (1 - C_1\gamma)^{-1} |I_k| \leq C_3 \gamma |I_k| \quad \text{si } \gamma < \gamma_0.$$

Il reste à vérifier (34) et (35).



Nous commencerons par la preuve de (35) car c'est la plus simple.

Posons  $K(x,y) = \frac{(a(y) - m_{[x,y]} a)^2}{x - y}$ . Le noyau  $K$  a deux propriétés remarquables ; il ne change pas si l'on ajoute une constante à la fonction  $a$  ou si l'on

remplace  $a$  par une fonction  $a_1$  égale à  $a$  sur un intervalle contenant  $[x,y]$ .

Pour prouver (35), on appelle  $a_1(x)$  le produit de  $a(x) - m_{J_k} a$  par la fonction caractéristique de  $J_k$ . Puisque  $a \in \text{BMO}$  a été convenablement normalisée, on a  $\|a_1\|_p \leq |J_k|^{1/p}$ . D'autre part, si  $x$  et  $y$  appartiennent à  $J_k$ ,  $K(x,y)$  ne change pas si l'on remplace  $a$  par  $a_1$ . Ainsi, pour tout  $x \in I_k$

$$T_*(a, f_1)(x) = T_*(a_1, f_1)(x).$$

Appelons  $\mathcal{C}_*^2(a, f)$  l'opérateur maximal  $\mathcal{C}_*(a, a, f)$  défini par (19) et  $\mathcal{C}_*^1(a, f)$  l'opérateur maximal  $\mathcal{C}_*(a, 1, f)$  défini par (19). Soit  $q_1$  l'exposant conjugué de  $p$ . Si  $a \in L^p$  et  $g \in L^{q_1}$ , on a, grâce à (21),

$$(36) \quad \left| \{x \in \mathbb{R}, \mathcal{C}_*^1(a, g)(x) > \lambda\} \right| \leq \frac{C}{\lambda} \|a\|_p \|g\|_{q_1}.$$

Le développement de  $(a_1(y) - m_{[x,y]} a_1)^2$  donne trois termes et l'on a donc

$T_*(a_1, f_1)(x) \leq H_*(a_1^2, f_1) + 2 \mathcal{C}_*^1(a_1, a_1 f_1) + \mathcal{C}_*^2(a_1, f_1)$ . L'opérateur maximal associé à la transformée de Hilbert envoie  $L^1$  dans  $L^1$ -faible. Les inégalités (20) et (36) entraînent alors (35).

Dans la vérification de (35), l'inégalité (20) et donc l'inégalité (2) ont été nécessaires ; ces deux inégalités expriment une propriété subtile des noyaux  $k(x,y)$  et  $K(x,y)$  nécessitant l'emploi de la variable complexe.

Au contraire la preuve de (34) n'utilisera que des propriétés plus superficielles de régularité du noyau provenant de ce que  $a \in \text{BMO}$ . Cette régularité du noyau est

décrite par la remarque suivante.

LEMME 4. Soient  $\xi$ ,  $x$  et  $y$  trois nombres réels et  $\ell > 0$  tels que  
 $|x - \xi| \leq \ell$  et  $|y - \xi| \geq 2\ell$ . Alors

$$(37) \quad |K(x, y) - K(\xi, y)| \leq \frac{C\ell}{(y-\xi)^2} |a(y) - m[\xi, y]a|^2 \\ + \frac{C\ell}{(y-\xi)^2} |a(y) - m[\xi, y]a| \log \left| \frac{y-\xi}{\ell} \right| + \frac{C\ell^2}{|y-\xi|^3} \log^2 \left| \frac{y-\xi}{\ell} \right|.$$

Comme ci-dessus  $a \in \text{BM0}$  est normalisée ;  $C$  désigne une constante absolue.

La preuve du lemme 4 ne présente aucune difficulté et sera donnée dans un instant.

Vérifions d'abord que (37) implique (34). Rappelons que  $\ell_k$  est la longueur de  $I_k$ .

Il suffit de montrer que, pour tout  $x \in I_k$ ,

$$(38) \quad |T_*(a, f_2)(x) - T_*(a, f_2)(\xi)| \leq C(M_q f)(\xi) ;$$

l'inégalité (38) découle elle-même de l'inégalité correspondante pour les opérateurs tronqués

$$(39) \quad |T_\varepsilon(a, f_2)(x) - T_\varepsilon(a, f_2)(\xi)| \leq C(M_q f)(\xi).$$

Si  $\varepsilon > 2\ell_k$ , soit  $\chi$  la fonction caractéristique de  $|y - x| \geq \varepsilon$  et soit

$\chi'$  celle de  $|y - \xi| \geq \varepsilon$ . Alors

$$|T_\varepsilon(a, f_2)(x) - T_\varepsilon(a, f_2)(\xi)| = |T(a, \chi f_2)(x) - \\ T(a, \chi' f_2)(\xi)| \leq |T(a, \chi f_2)(x) - T(a, \chi f_2)(\xi)| + \\ |T(a, \chi_1 f_2)(\xi)| \quad \text{où } \chi_1 = \chi - \chi'.$$

Définissons  $D$  par  $\frac{\varepsilon}{2} \leq |y - \xi| \leq \varepsilon$  ; alors  $J_k^C \cap \text{supp } \chi_1 \subset D$ . Donc

$$|T(a, \chi_1 f_2)(\xi)| \leq \int_D \frac{|a(y) - m[\xi, y]a|^2}{|\xi - y|} |f(y)| dy \leq C(M_q f)(\xi), \quad \text{grâce à l'inégalité}$$

de Hölder et à (24). Il reste à majorer  $|T(a, \chi f_2)(x) - T(a, \chi f_2)(\xi)|$ . Si  $0 < \varepsilon \leq 2\ell_k$ ,  $T_\varepsilon(a, f_2)(x) = T(a, f_2)(x)$  pour tout  $x \in I_k$ . Finalement (39) résulte du lemme suivant (appliqué à  $f_2$  ou à  $\chi f_2$ ).

LEMME 5. Si une fonction  $g$  est identiquement nulle sur  $J_k$ , on a, pour  $x$  et  $\xi \in I_k$ ,

$$(40) \quad |T(a, g)(x) - T(a, g)(\xi)| \leq C(M_q g)(\xi).$$

On a, en fait  $T(a, g)(x) - T(a, g)(\xi) = \int [K(x, y) - K(\xi, y)] g(y) dy$ . L'inégalité (37) conduit à trois termes dont les majorations sont semblables ; c'est pourquoi nous n'examinerons que le premier. On a

$$(41) \quad C\ell \left| \int_{J_k^c} \frac{(a(y)-m[\xi, y]a)^2 g(y)}{(\xi - y)^2} dy \right| \leq \\ C\ell \left( \int_{J_k^c} \frac{|a(y)-m[\xi, y]a|^p}{(\xi - y)^2} dy \right)^{2/p} \left( \int_{J_k^c} \frac{|g(y)|^q}{(\xi - y)^2} dy \right)^{1/q}.$$

En découpant  $J_k^c$  en "couronnes"  $2^j \ell_k \leq |\alpha_k - y| \leq 2^{j+1} \ell_k$  et en utilisant (24) et (28) on majore sans peine (41) par  $C(M_q f)(\xi)$ .

Il reste à prouver le lemme 4. Quelques remarques très simples sur  $BM_0$  sont nécessaires. Soit  $a$  une fonction de  $BM_0$  pour laquelle le premier membre de (24)

est égal à 1 et soient  $I_1$  et  $I_2$  deux intervalles tels que  $|I_1| \leq |I_2| \leq 2|I_1|$

et  $I_1 \cap I_2 \neq \emptyset$ . On a alors, presque immédiatement,  $|m_{I_2} a - m_{I_1} a| \leq 6$ .

Si maintenant  $2^{N-1}|I_1| \leq |I_2| \leq 2^N|I_1|$ ,  $N \geq 1$ , et  $I_1 \cap I_2 \neq \emptyset$ , il vient

$|m_{I_2} a - m_{I_1} a| \leq 6N$ . Enfin, soient  $x, x', \xi$  et  $y$  quatre nombres réels tels que

$|x - \xi| \leq \ell$ ,  $|x' - \xi| \leq \ell$  et  $|y - \xi| \geq 2\ell$ . Alors

$$(42) \quad \left| m_{[x', y]} a - m_{[x, y]} a \right| \leq C \frac{\ell}{|y - \xi|} \log \frac{|y - \xi|}{\ell}.$$

La vérification de (42) est facile. On appelle  $I_1$  l'intervalle  $[\xi - \ell, \xi + \ell]$  et  $I_2$  l'intervalle  $[x, y]$ ; on remplace, dans le membre de gauche de (42),  $a$  par  $a - m_{I_1} a$ . Alors, on remarque que

$$\begin{aligned} \left| m_{[x', y]} a - m_{[x, y]} a \right| &\leq \left| \frac{x' - x}{y - x'} (m_{I_2} a - m_{I_1} a) \right| + \\ &\left| \frac{1}{y - x} \int_{x'}^x (a(t) - m_{I_1} a) dt \right| \leq C \frac{\ell}{|y - \xi|} \log \frac{|y - \xi|}{\ell} + C \frac{\ell}{|y - \xi|} \end{aligned}$$

La preuve du lemme 4 résulte maintenant dans difficulté de l'inégalité (42) et la preuve de (27) est complète.

Pour terminer notre programme, il faut encore vérifier que si  $a \in \text{BM0}$  et  $f \in L^2(\mathbb{R})$ ,  $\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|y-x| \geq \varepsilon} \frac{(a(y) - m_{[x, y]} a)^2}{x - y} f(y) dy$  existe presque partout.

Compte tenu de (27), il suffit d'examiner le cas  $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ . En développant  $(a(y) - m_{[x, y]} a)^2$ , on obtient trois termes que nous examinerons successivement à l'aide du

LEMME 6. Soient  $b$  et  $g$  deux fonctions de  $L^2(\mathbb{R})$ . Appelons  $B$  une primitive de  $b$ . Alors

$$(43) \quad \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|y-x| \geq \varepsilon} \frac{B(x) - B(y)}{(x-y)^2} g(y) dy$$

existe presque partout.

La preuve du lemme est très simple : l'opérateur maximal associé envoie  $L^2$  dans  $L^1$  (grâce à (21) où  $a = 1$ ). Il suffit de considérer le cas particulier où

$g \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ . Dans ce cas une intégration par parties donne

$$- \left[ \frac{B(x) - B(y)}{x - y} g(y) \right]_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} + \int_{|y-x| \geq \varepsilon} \frac{b(y)g(y)}{x - y} dy - \int_{|y-x| \geq \varepsilon} \frac{B(x) - B(y)}{x - y} g'(y) dy ;$$

les deux premiers termes ont des limites presque partout et le troisième n'est plus une intégrale singulière.

Revenons à la preuve de l'existence presque partout de (25). En développant

$(a(y) - m_{[x,y]} a)^2$  on obtient trois termes. Le premier conduit à

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|y-x| \geq \varepsilon} \frac{a^2(y)f(y)}{x - y} dy ; \text{ cette limite existe presque partout car } a^2(y)f(y) \in L^2.$$

Le second conduit à  $-2 \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|y-x| \geq \varepsilon} \frac{A(x) - A(y)}{(x-y)^2} (af)(y) dy$  ; appelons  $[-n, n]$ ,

$n \in \mathbb{N}$ , un intervalle contenant  $x$  et le support de  $f$  et définissons une fonction

$b \in L^2(\mathbb{R})$  par  $b = a$  sur  $[-n, n]$ ,  $b = 0$  ailleurs. Soit  $B$  une primitive de

$b$ . On a

$$\int_{|y-x| \geq \varepsilon} \frac{A(x) - A(y)}{(x-y)^2} (af)(y) dy = \int_{|y-x| \geq \varepsilon} \frac{B(x) - B(y)}{(x-y)^2} (af)(y) dy$$

et l'on peut alors appliquer le lemme 6.

Le dernier terme  $\int_{|y-x| \geq \varepsilon} \frac{|A(x) - A(y)|^2}{(x-y)^3} f(y) dy$  s'étudie par intégration par parties (comme au § 2) et l'on est ramené à des termes semblables à ceux étudiés au cas précédent.

Bibliographie



- [1] BAJANSKI, B. M. and COIFMAN, R. On singular integrals. Proc. Sympos. Pure Math. vol. 10. Amer. Math. Soc., Providence, R. I. (1967).
- [2] BURKHOLDER, D. L. and GUNDY, R. F. Extrapolation and interpolation of quasi-linear operators on martingales. Acta Math. vol. 124 (1970), 249-304.
- [3] CALDERON, A. P. Commutators of singular integral operators. Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A. 53 (1965), 1092-1099.
- [4] CALDERON, A. P. On algebras of singular integral operators. Proc. Sympos. Pure Math., vol. 10. Amer. Math. Soc. Providence, R. I. (1967), 18-55.
- [5] CALDERON, C. P. On commutators of singular integrals. Studia Math. 53 (1975), 139-174.
- [6] COIFMAN, R. and FEFFERMAN, Ch. Weighted norm inequalities for maximal functions and singular integrals. Studia Math. 51 (1974), 241-250.
- [7] COIFMAN, R. and MEYER, Y. Commutators of singular integrals. Trans. Amer. Math. Soc. 212 (1975), 315-331.
- [8] FEFFERMAN, C. and STEIN, E.  $H^p$  spaces of several variables. Acta Math. 29 (1972), 137-193.
- [9] ROCHBERG, R. Communication orale (Washington University).
- [10] STEIN, E. and WEISS, G. Introduction to Fourier analysis on Euclidean spaces. Princeton University Press (1971).
- [11] ZYGMUND, A. Trigonometric series. Vol. I and II, C.U.P. (1968).

Department of Mathematics  
Washington University  
ST-LOUIS, MO, 63130, U. S. A.

Université Paris-Sud  
Centre Scientifique d'Orsay  
Bâtiment 425  
91405 ORSAY (France)



